

Вакцинация против гепатита В

Вирусный гепатит В (ВГВ) — инфекционное заболевание человека, характеризующееся преимущественным поражением печени. Исходом гепатита В может быть, как полное выздоровление, так и развитие хронического гепатита В с переходом в цирроз и рак печени. Возбудителем болезни является вирус гепатита В, относящийся к семейству *Нepadnaviridae*.

Инкубационный период (период от момента заражения до выработки антител или появления клинических симптомов) при гепатите В в среднем составляет от 45 до 180 дней.

Источниками инфекции при гепатите В являются больные с различными формами заболевания. Основными факторами передачи ВГВ являются кровь и другие биологические жидкости организма (сперма, вагинальное отделяемое, слюна).

Инфицирование возможно при любых манипуляциях, как медицинских, так и немедицинских, проводимых с повреждением кожных покровов или слизистых оболочек: при нанесении татуировок, проведении косметических и косметологических процедур («инъекции красоты», маникюр, педикюр), при лечении у стоматолога, переливании крови и других медицинских вмешательствах. Также можно заразиться при незащищенном половом контакте, если партнер инфицирован. Контактнo-бытовой путь передачи гепатита В реализуется при тесном контакте с заболевшим и нарушении правил личной гигиены — использовании общих маникюрных принадлежностей, бритв и зубных щеток. Еще один возможный путь передачи — вертикальный, от матери к ребенку во время беременности и родов.

При ВГВ появляется желтушность кожных покровов и склер, обесцвечивание кала, потемнение мочи, встречаются примерно в 30% случаев. В подавляющем большинстве инфекция протекает в безжелтушной форме, особенно часто у детей, однако и у взрослых доля таких вариантов может достигать 70%. Другие симптомы, которые могут встречаться при гепатите В: повышение температуры, слабость, снижение аппетита, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье, боли в суставах.

Основным методом профилактики гепатита В является вакцинация, которая проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению вакцин.

Вакцинация против гепатита В состоит из 3 прививок:

- 1-я в первые 24 часа после рождения;
- 2-я в возрасте 1 месяц;
- 3-я в возрасте 6 месяцев.

Завершенный курс вакцинации против гепатита В обеспечивает защиту от инфицирования, клинического заболевания и хронического течения, а также от заражения гепатитом D (оно возможно только при наличии в организме вируса гепатита В).